

Et tilskuddsfôr til våtfôring av svin

Uønsket vekst av bakterier, gjær og mugg i våtfôringsanlegget til svin kan gi problemer med appetitt, reproduksjon, diare og andre helseproblemer. Bactocell Farm inneholder en melkesyreproduserende bakterie som styrer den mikrobiologiske kvaliteten av fôret mot produksjon av melkesyrebakterier.

- Gunstig til bruk i sommerhalvåret eller hos deg som strever med feilgjæring i våtfôranlegget.
- Bactocell Farm hindrer oppblomstring og vekst av gjær, mugg, enterobakterier, coli og andre patogene bakterier i våtfôret til svin.
- Produksjon av melkesyre gir en frisk og syrlig smak. Melkesyrebakteriene har også en probiotisk effekt hvor de styrker mikrofloraen i fordøyelseskanalen.
- Bactocell Farm kan forbedre tarmhelsen og reduserer fordøyelsesproblemer som diaré. Forsøk har vist lavere dødelighet som følge av enterobakterier (ballonggris) hos slaktegris som har fått Bactocell i fôret sammenlignet med dem som ikke fikk tildelt tilskuddet.

Bruksanvisning

Bactocell Farm er et pulver som tilsettes med mikrodoserer i blandetanken i våtfôranlegget.

Før Bactocell Farm tas i bruk første gang bør anlegget ideelt vaskes og desinfiseres.

Det er mulig å starte opp med Bactocell Farm uten å gjøre dette først, man må da påregne noe lenger tid før man oppnår virkning av produktet fordi det vil ta lenger tid å bygge opp mengden melkesyrebakterier.

Ved vask og desinfeksjon:

1. Det tilsettes med mikrodoserer 125 gram Bactocell Farm per tonn tørt fôr i første fôrblending etter vask og desinfeksjon. Bactocell tilsettes som første komponent i resepten etter vann og før fôr.
2. Første, andre og tredje dag tilsettes ytterligere 250 gram Bactocell Farm per tonn tørt fôr en gang per dag. Tilsettes manuelt til tanken, når denne er tom, kun rest i bunnen.
3. Fortsatt tilsetning av 125 gram Bactocell Farm per tonn tørt fôr, for å holde biofilmen i anlegget under kontroll.

Uten vask og desinfeksjon:

1. Det tilsettes med mikrodoserer 125 gram Bactocell Farm per tonn tørt fôr. Tilsettes som første komponent i resepten etter vann og før fôr.
2. Fortsatt tilsetning av 125 gram Bactocell Farm per tonn tørt fôr, for å holde biofilmen i anlegget under kontroll.

Holdbarhet og oppbevaring

Oppbevares tørt og kjølig. Ved riktig lagring har produktet en holdbarhet på 24 mnd fra produksjonsdato.

Kommer i pakning på 5 kg.